

Излечимы ли инфекции, передаваемые половым путем?

Вы можете жить полноценной жизнью, зная, что не подвергаете риску жизнь близких людей, т.к. большинство инфекций излечимы, если лечение начато своевременно, адекватно и доведено до конца. При некоторых заболеваниях (генитальный герпес) после соответствующего курса лечения можно добиться длительных периодов без проявления симптомов болезни.

Министерство здравоохранения Новосибирской области
ГКУЗ НСО
«Региональный центр медицинской профилактики»
<http://rcmp-nso.ru/>

ЧТО СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ОБ ИНФЕКЦИЯХ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ (ИППП)



ИППП – это инфекции, передаваемые половым путем. Наиболее часто встречающиеся: сифилис, гонорея, трихомониаз, хламидиоз, аногенитальные бородавки, генитальный герпес.

Важная информация об ИППП

ПУТИ ЗАРАЖЕНИЯ:

- **Преимущественные:**

все виды незащищенных сексуальных контактов (вагинальные, оральные, анальные),

- **Возможные:**

через инфицированную кровь (от матери к ребенку), при несоблюдении правил личной гигиены.

Симптомы ИППП:

Боль или жжение при мочеиспускании, выделения из половых органов, высыпания на коже и слизистых оболочках, НО часто ИППП протекают и бессимптомно.

Самоизлечения при ИППП не бывает, необходимо как можно раньше обратиться к дерматовенерологу, чтобы не возникло осложнений.

При подозрении на ИППП:

- ✓ не отчаиваться,
- ✓ не заниматься самолечением, в том числе по рекомендациям друзей и интернет-ресурсов, а **немедленно обратиться к врачу-специалисту.**

Как узнать есть ли у Вас ИППП?

Больны ли Вы может определить только врач, проведя необходимое обследование.

Если у полового партнера установлен диагноз ИППП, а у Вас нет симптомов заболевания, Вам необходимо обратиться к врачу-дерматовенерологу.



Обследование на ИППП является конфиденциальным (результаты не разглашаются) и включает целый ряд исследований.

Как защититься от ИППП?

1. Строить сексуальные отношения только с одним партнером, который здоров и верен Вам!
2. Правильно использовать презерватив при каждом половом акте. Это значительно снижает риск инфицирования.
3. Отказаться от рискованного поведения: не употреблять наркотиков и не злоупотреблять алкоголем, так как их действия снижают самоконтроль.