

Прививки прово-
дятся согласно Националь-
ному календарю прививок РФ: детям
– начиная с 3-месячного возраста.

Взрослым необходимо получать
ревакцинацию каждые 10 лет, так как
противодифтерийная прививка
создает невосприимчивость к
инфекции в течение 10 лет.

ВАКЦИНАЦИЯ

1 прививка: возраст ребенка 3 мес.

ВАКЦИНАЦИЯ

2 прививка: возраст ребенка 4,5 мес.

ВАКЦИНАЦИЯ

3 прививка: возраст ребенка 6 мес.

1 РЕВАКЦИНАЦИЯ

возраст ребенка 1,5 года

2 РЕВАКЦИНАЦИЯ

возраст ребенка 6 лет

3 РЕВАКЦИНАЦИЯ

возраст ребенка 14 лет

г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, д. 7 а
Общественная приемная

201-08-59

Горячая линия

8-800-350-50-60


e-mail: Upravlenie@54.rosпотребнадзор.ru




Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области

WWW.54.ROSPOTREBNADZOR.RU

ДИФТЕРИЯ





ДИФТЕРИЯ

-одна из самых опасных инфекционных болезней, которая известна со времен Гиппократа под названием "смертельная язва глотки", "удушающая болезнь".


Заболевание характеризуется сильной интоксикацией, поражением сердечно-сосудистой и нервной систем и образованием характерных пленок на слизистых оболочках верхних дыхательных путей (реже - на конъюнктивах, в ранах и др.).



Различают дифтерию зева, горла, носа, глаз, половых органов, кожи, раны и др.

Типичная дифтерия, в свою очередь, бывает локализованной, распространенной и токсической.

Дифтерийные бактерии значительно устойчивы во внешней среде. В дифтерийной пленке, в капельках слюны, на ручках дверей, детских игрушках сохраняются до 15 дней. В воде и молоке выживают в течение 6-20 дней. Неблагоприятно на них действуют прямые солнечные лучи, высокая температура. При кипячении погибают в течение 1 мин.



ИСТОЧНИК

ИНФЕКЦИИ

- больной человек или носитель возбудителя заболевания. Инфекция передается воздушно-капельным путем, заражение возможно даже при кратковременном контакте. Инкубационный период длится 2-10 дней.

Когда-то дифтерией болели, как правило, только дети. Сейчас болеют и взрослые, особенно в крупных городах.

Дифтерийная инфекция опасна развитием осложнений.

Чаще всего дифтерия начинается как обычная ангин.

Поэтому, при появлении признаков ангины необходимо в первый же день вызвать врача.

БОЛЕЗНЬ МОЖНО ПРЕДУПРЕДИТЬ - СВОЕВРЕМЕННО ПОСТАВИТЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ ПРИВИВКУ!