



НЕЛЬЗЯ ЗАРАЗИТЬСЯ ВИЧ ЧЕРЕЗ:

- дверные ручки,
- места общего пользования,
- еду, посуду,
- душ, баню, бассейн,
- укусы кровососущих насекомых,
- поцелуи и прикосновения.



Министерство
здравоохранения НСО



ГБУЗ НСО ГИКБ №1,
«Центр по профилактике
и борьбе со СПИД»

Более полную информацию по вопросам ВИЧ-инфекции
Вы можете получить по телефону «горячей линии»:



(383) 209-02-18

(383) 209-02-19

ГБУЗ НСО «Городская инфекционная клиническая больница № 1»

Центр по профилактике и борьбе со СПИД

Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 40, корпус 5

Тел. (383) 218-20-42



www.spidnso.ru

защити
СЕБЯ
сегодня



ГБУЗ НСО ГИКБ №1,
«Центр по профилактике
и борьбе со СПИД»

СПИД - Синдром Приобретенного
Иммунодефицита (вызван Вирусом
Иммунодефицита Человека).

Правильное название этого
заболевания - ВИЧ-инфекция, а СПИД
является конечной стадией.

В настоящее время не найдено
лекарство, способное полностью
уничтожить вирус иммунодефицита в
организме человека. Поэтому лечение
ВИЧ-инфицированных направлено на
то, чтобы снизить скорость
размножения вируса и не допустить
развития СПИДа.

Жизнь

Любовь

Семья

В ЗАЩИТЕ

3 СУЩЕСТВУЕТ ТОЛЬКО СПОСОБА ПЕРЕДАЧИ ВИРУСА:



КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК имеет право добровольно, анонимно и бесплатно пройти тестирование на ВИЧ!

Через кровь:

- при употреблении внутривенных наркотиков;
- при использовании нестерильного инструментария для татуировок и пирсинга;
- при использовании чужих бритвенных принадлежностей, зубных щеток с видимыми остатками крови.

Половой путь передачи:

При незащищенном (без презерватива) проникающем половом контакте, даже если он единственный.

От матери к ребенку:

Во время беременности, родов, кормления грудным молоком (если беременная женщина с положительным анализом на ВИЧ своевременно обращается к врачу и получает препараты антивирусной терапии - это дает возможность/ помогает ребенку родиться здоровым).

Определить наличие вируса в организме можно только с помощью специального анализа крови. Для достоверности тест необходимо сделать не раньше чем через 3 месяца после опасной в плане инфицирования ситуации.

Тест на ВИЧ-инфекцию можно сделать в поликлинике по месту жительства, а также в Центре СПИД по адресу: г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 40, корпус 5.

Тел. (383) 218-20-42



ПРОСТО НУЖНО:

- воздержаться от сексуальных отношений, либо правильно использовать презерватив при каждом сексуальном контакте;
- использовать стерильный инструментарий при медицинских и прочих (тату, пирсинге, маникюре и т.д.) процедурах и манипуляциях;
- помнить о том, что алкоголь и наркотики изменяют состояние сознания, снижают способность человека трезво оценивать риск инфицирования.

ЭТО ДОЛЖНА ЗНАТЬ КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА:

Ранее обращение в женскую консультацию и постановка на учет до 12 недель беременности - это своевременное тестирование на ВИЧ/СПИД, наблюдение у врача, чтобы вы и ваш ребенок были в полном порядке.

Ранее выявление ВИЧ-инфекции позволит своевременно назначить специальные препараты во время беременности, а также во время родов и новорожденному. Обязательно исключение грудного вскармливания для снижения риска передачи ВИЧ-инфекции.