

Риск заражения для обоих партнёров возрастает при сопутствующих венерических заболеваниях (ЗППП).

Заболевания, передающиеся половым путём, справедливо называют «воротами для вируса», поскольку они вызывают язвы или воспаление слизистой оболочки половых органов.

Факторы, повышающие риск заражения при половом контакте



Воспаление также вызывает изменение в мембране клеток, что увеличивает риск проникновения вируса.

У женщины при незащищённом половом акте в организм попадает большое количество вируса, содержащегося в семенной жидкости мужчины. Площадь поверхности, через которую вирус может проникнуть внутрь женщины, значительно больше (слизистая оболочка влагалища). Кроме того, в семенной жидкости ВИЧ содержится в большей концентрации, чем в секретах влагалища. Риск для женщины возрастает при ЗППП, эрозии шейки матки, ранках или воспалениях слизистой оболочки, при менструации, а также при разрыве девственной плевы.

Риск заражения и для мужчины, и для женщины увеличивается, если у партнёра эрозия шейки матки.

Риск заражения при анальном контакте значительно выше, чем при вагинальном, поскольку высока вероятность травм слизистой оболочки ануса и прямой кишки, что создаёт «входные ворота» для инфекции.



Взрослые люди должны знать:

презервативы существуют для того, чтобы защищать ОБОИХ партнёров от возможных нежелательных последствий близости (в том числе беременности), а вовсе не для того, чтобы с их помощью выяснить вопрос о «доверии» или «недоверии».

И помните:

алкоголь и наркотики неизбежно влияют на принимаемые решения: ведь под их влиянием человек хуже контролирует свои действия, легче идёт на риск, пренебрегает необходимыми мерами предосторожности. Презерватив защищает только когда им правильно пользуются.

**ПАДА НА ПУТИ
К ЗДОРОВЬЮ**




Вирус
ИЧ
Человека

разумит:

КС
дефицита

ас



Серьёзность

последствий

зменит

орогу



ГБУЗ НСО ГИКБ №1,
«Центр по профилактике
и борьбе со СПИД»

Получи информацию на сайте:

spidnso.ru

и по телефону «горячей линии»:

209-02-19



↓ 3 мес. ↓

Анализ крови может подтвердить заражение в среднем через 3 месяца после инфицирования.

Носитель вируса иммунодефицита может передавать ВИЧ другим людям уже с первых дней заражения.

Не существует способа излечения или вакцины от ВИЧ/СПИДа.

ВИЧ передаётся через: кровь, сперму, влагалищные выделения, грудное молоко. Следовательно, заражение произойдёт, если какая-то из этих жидкостей инфицированного человека попадает в организм здорового.

ВИЧ можно заразиться:

- при совместном пользовании шприцами и другим инъекционным оборудованием (ложками, фильтрами, посудой для приготовления наркотиков);
- при незащищённом оральном, вагинальном, анальном проникающем сексуальном контакте (без презерватива);
- при контакте инфицированной крови с открытыми ранами;
- при повреждениях кожного покрова до крови;
- через нестерильные иглы для пирсинга, татуировок и иглоукалывания;
- при совместном пользовании бритвами, бритвенными лезвиями;
- ВИЧ может передаваться от матери к ребёнку во время беременности и родов, а также при кормлении грудью.

Вы должны знать, что очень рискуете, если будете пренебрегать способами предохранения при сексуальном контакте с малознакомым партнёром. Более 30 заболеваний, которые передаются половым путём, могут очень и очень осложнить вашу жизнь, а иногда и привести к непоправимым трагическим последствиям, перечеркнув все мечты и планы.

Как можно быстрее следует обратиться к врачу, если вы обнаружили у себя один из этих признаков или их сочетание:

- покраснение в области половых органов и заднего прохода;
- зуд и жжение в этой области;
- учащённое болезненное мочеиспускание;
- следы необычных выделений на белье.

Это могут быть сифилис, гонорея, трихомониаз, хламидиоз, генитальный герпес, кондиломы и т.д. Также это может быть и ВИЧ-инфекция!

ВИЧ-инфекция —

заболевание, вызванное вирусом иммунодефицита человека, включающее в себя период длительного — 10 и более лет — вирусносительства и СПИД.

СПИД —

это стадия проявления болезни, при которой наблюдаются необратимые нарушения функций организма. На этой стадии наступает смерть. Эффективных лекарственных препаратов против СПИДа пока нет. Симптомы проявляются от месяца до 15 лет после инфицирования: на ранних стадиях — симптомы ОРЗ; на стадии СПИДа — пневмонии, опухоли, стойкие грибы-дрожжи, туберкулёз и другие болезни.



Пользуйтесь презервативами.

ВИЧ не может существовать вне человеческого тела, но он может сохранять жизнеспособность внутри шприца или иглы!

ВИЧ не передаётся через:

- пот;
- слёзы;
- объятия;
- посуду инфицированного человека;
- курение одной сигареты;
- укусы комаров;
- слюну;
- дыхание;
- рукопожатие;
- сиденье унитаза.



Любые бытовые контакты с ВИЧ-инфицированными безопасны!



Безопасны!