

Спроси у того, кто знает!




ВИЧ-инфекция и ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ

Существуют заболевания, которыми человек может заразиться при сексуальных контактах.

Их сокращенно называют **ИППП** – **И**нфекции, **П**ередаваемые **П**оловым **П**утем.

В настоящее время известно более **20 ВИДОВ** инфекций, передающихся половым путем и ВИЧ-инфекция только одна из них.



Важно!

Постоянный воспалительный процесс, вызванный ИППП, увеличивает вероятность заразиться ВИЧ в несколько раз!

ИППП. Работа над ошибками


Заблуждение №1

Если нет симптомов, то нет и болезни

Абсолютно точно, что многие ИППП имеют схожие симптомы:

- ✓ **боль при мочеиспускании**
- ✓ **зуд, жжение,**
- ✓ **выделения из половых органов**


Но часто бывает, что нет никаких проявлений, и человек даже не думает о болезни, не предпринимает никаких мер.



Важно! Без специальных анализов нельзя сказать, болен он или нет.

Заблуждение №2

**Если симптомы исчезли,
то и болезнь прошла**



«Сама по себе» подобная болезнь пройти не может. Для выздоровления всегда необходимо специальное лечение.

Чем раньше начать лечение, тем легче и быстрее можно вылечиться и меньше шансов, что после себя болезнь оставит какие-либо осложнения.

А самое главное – **проводить лечение и наблюдение должен врач.**

Заблуждение №3

**Партнер, у которого симптомы
проявляются сильнее, – источник инфицирования в паре**

Это не всегда так. Заболевание у разных людей может протекать по-разному. Это зависит от общего состояния здоровья человека и его иммунитета.

Заблуждение №4

**Можно не бояться заразиться,
потому что все ИППП лечатся**


Многие ИППП приводят к бесплодию, а ВИЧ-инфекция – это хроническое неизлечимое заболевание.

Однозначная правда:

**Если человек не пользовался
презервативом и чувствует себя здоровым,
то не значит, что он ничем не заразился**

Все основания считать себя здоровым есть только у человека, воздерживающегося от сексуальных контактов или пользующегося презервативом при каждом половом контакте и прошедшего обследование на все ИППП.

А если уже обнаружено ИППП, скорее всего презерватив не использовался, значит, был риск заразиться и ВИЧ.



(383) 209-02-18
www.test-mobil.ru
www.spidnso.ru



ГБУЗ НСО
«Городская инфекционная
клиническая больница № 1»
Центр по профилактике
и борьбе со СПИД